



**Gobierno
Departamental
Autónomo**
Santa Cruz

TALLER CAPACITACION PRODUCCION DE OVINOS DE PELO



Santa Cruz – Bolivia

DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Preparado por: DPC

Lic. Agr. Antonio Méndez

Introducción

1. Infraestructura
2. Manejo
3. Sanidad
4. Alimentación

INFRAESTRUCTURA

CORRAL

1. Ubicado a 30 - 40 metros de la vivienda
2. Terreno:
 - a. leve declive,
 - b. desagüé y
 - c. sin encharcamiento
1. Tamaño de acuerdo a la cantidad de animales
 - a. 1,5 m²/animal adulto
2. Construido con material existente en la zona

Cobertizo:

Techo que cubre parte del corral para protección de los animales de un tamaño de 0,5 m²/animal adulto.

Corral para corderitos:





Construido dentro del corral y debajo del cobertizo.

Salero:

Deberá estar ubicado dentro del corral y debajo del cobertizo para evitar que la lluvia dañe la sal.



MODELO DE CORRAL CON COBERTIZO



MANEJO

Selección de reproductores:

- 1.- Por la salud del animal
- 2.- en los machos ver aparato reproductor, que no tenga descenso de prepucio.
- 3.- en las hembra ver conformación de ubres, sanas y buenas.



4.- por la edad de los animales.

CARACTERISTICAS DE LOS DIENTES (incisivos)	EDAD DEL ANIMAL
Con 8 dientes pequeños y delgados (d.de leche)	Menor de un año
Con 2 dientes más gruesos y largos en el medio	De un año y medio
Con cuatro dientes más gruesos y largos	De dos a dos años y medio
Con seis dientes gruesos y largos	De tres años de edad
Con todos los dientes gruesos y largos	De cuatro años de edad
Cuando los dientes aparecen viejos y gastados	Mas de cuatro años



IDENTIFICACION

- En la crianza tradicional determina la propiedad de los animales (señal).
- El uso de aretes sirve para registrar de que Madre proviene y a que parición corresponde
- USO DE REGISTRO
- Fechas de cruzamientos
- Quienes fueron sus padres
- Fecha de nacimiento y destete
- Fecha de aplicación de medicamentos
- Ventas, consumo y muertes de los animales, etc.



Estacionalidad de la producción:

Reduce el tiempo de atención de los recién nacidos y se logra la eficiencia reproductiva del animal.

Manejo de la hembra reproductora:

El celo aparece a partir de los 7 a 9 meses de edad, pero se debe hacer montar a los 10 a 13 meses.



- Manejo de la gestación dura 148-153 días, en este lapso en lo posible se debe evitar golpes, manejo brusco y correteos.
- **Manejo de la gestación y parto:**
 - El parto se debe realizar en un lugar libre de ataques de predadores. El parto normal dura 12 horas, si supera ese tiempo quiere decir que necesita ayuda (parto distócico).

Cuidados del recién nacido:

- Aplicación de yodo en el ombligo.
- Hacer mamar calostro manteniendo 3 días con su madre.
- Adopción de cabritos nacidos de partos múltiples



Manejo hasta el destete:

Mantener a los corderitos separados durante el día hasta el mes de edad, luego soltarlos para que empiecen a comer pastos y desparasitarlos a los dos meses de edad, se los debe destetar entre los 3 a 5 meses.

Castración:

La castración se la debe realizar a los 2 meses de edad se justifica por evitar degeneración genética por consanguinidad.



Manejo del reproductor:

Se recomienda su reemplazo cada 13 a 14 meses, porque podría montar a sus propias hijas, provocando problemas de consanguinidad



SANIDAD

Principales enfermedades del ganado ovino:

Enfermedades contagiosas:

- Neumonía
- Poli artritis (nudera)
- Queratoconjuntivitis infecciosa (mal de ojos, ceguera)
- Pietin (pedera, panadizo, podo dermitis)
- Diarrea
- Mastitis
- Viruela (mal de la boca)
- Rabia
- Gangrena (carbunco sintomático)
- Entero toxemia
- Brucelosis
- Ántrax (lengüeta, carbunco he mático)

Parásitos Internos:

- Gastrointestinal
- Pulmonar
- Cestosis (tenias)
- Cestosis larvarias (cenurosis cerebral)
- Fasciolasis

- Coccidiosis
- Babesiosis

Parásitos externos:

1. Miasis cavitaria
2. Sarna
3. Garrapatas

Problemas de intoxicación y metabolismo:

1. Fotosensibilización (fitomicotoxicosis)
2. Intoxicación por plantas
3. Intoxicación o envenenamiento por organofosforados
4. Acidosis (empachamiento)
5. Bocio



ACTIVIDADES	MESES DEL AÑO											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Rabia				x						X		
Aftosa				x						X		X
Ántrax					X						X	
Gangrena					X						X	
Enterotoxemia					X						x	
Desparasitación Interna					X						X	
Desparasitación externa					x						X	

CALENDARIO SANITARIO

ALIMENTACION

Pastos recomendados:

1. Pasto estrella africana
2. Pasto bremura

3. *Brachiaria humidicola*
4. Pasto grama negra
5. Gatón Panic

