



Calendario Sanitario para Ovinos

Tratamientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observaciones
Mancha, Edema maligno y Enterotoxemia			2			3					1		1- Corderos dos dosis con intervalo de 20 días empezando 30 días antes de la esquila o destete 2- A los seis meses 3- Adultos 30 días pre-esquila
Carbunco			2			3					1		(1) 3 meses, (2) 6 meses, (3) anual 30 días pre-esquila
Desparasitación		1		2			3			5		4	(1) pre-servicio, (2) Fin-servicio, (3) pre-parto y (4) destete a los adultos y recría y (5) Señalada unicamente a corderos
Tétanos						2					1		(1) 3 meses, (2) anual 30 días pre-esquila
Ectima Contagioso													Escarificación a los corderos en el momento de señalada
Exámen clínico de carneros													Revisación genitales machos y analisis serológico de Brucelosis
Afecciones Podales													Despezuñado y pediluvio
Sarna y piojos													2 baños con intervalo de 10 a 12 días o endectocidas
Miasis													
<p>Desparasitación: análisis de materia fecal para determinar la presencia de parásitos gastrointestinales en la majada, HPG previo a la desparasitación. Afección Podal: recorte de pezuñas y pediluvios con Formol 5% ó Sulfato Zinc 5% (las patas deben permanecer en el baño no menos de 3 minutos). Miasis: Prevención en las heridas de la esquila</p>													