

- 
- 
- 

# *“Por una Encarnerada Exitosa”*

*Nico Perez/Batlle y Ordoñez 17  
de Noviembre del 2011*



- 
- 
- 

## SITUACION ACTUAL

- **Muy buenos precios de Carne Ovina y Lana**
- **Excelentes perspectivas del negocio ovino**



- 
- 
- 

- **Ecografía**

- 45 a 60 días de retirados los carneros haga diagnóstico de gestación para identificar ovejas falladas, gestando un cordero y gestando mellizos.

- 
- 
- 

# Decisiones y Objetivos

- Cantidad de hembras a encarnerar
- Recursos que voy a dedicar



- 
- 
- 

# PLANIFIQUE CON TIEMPO LA ENCARNERADA



- 
- 
- 

# Decisiones y Objetivos

- Fecha de encarnerada
- **Cantidad de hembras a encarnerar**



- 
- 
- 

# CANTIDAD de HEMBRAS a ENCARNERAR

- **Encarnerada de borregas**

Recría de borregas

- **Destete**
- **Refugos**



- 
- 
- 

## Revisación Clínica de carneros

- Al menos 60 días antes de la encarnerada
- Potencialmente aptos para la reproducción
- Preveer reposición de carneros
- **NECESIDAD:** 3% de carneros aptos a la encarnerada





# EXAMEN CLINICO-REPRODUCTIVO

## RELEVAMIENTO NACIONAL (1988)

(2952 carneros en 84 predios de 7 Dptos.)

**24.4 % clínicamente NO APTOS**

**8.6 % Foot rot**

**6.5 % Epididimitis**

**4.7 % Testiculos pequeños**


**2.3 % Espermiostásis**

**2.3 % Atrofia testicular**

61.8 % infecciones crónicas (FR y Epidid.)

30 % defectos congénitos (Hipopl.yEspermiost.)

- 
- 
- 



# RECRÍA ADECUADA DE LAS BORREGAS



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



# ENCARNERADA 2 d

- **AUMENTO DE 30 A 35% EL NUMERO DE OVEJAS ENCARNERADAS**
- **CÓMO LLEGO?**

**Peso Actual**

**Peso Objetivo**

**Ganancia y recursos necesarios**



# ENCARNERADA 2 d

- **PESO MINIMO INDIVIDUAL**
- Merino e Ideal - 34 kgs
- Corriedale y Romney - 36 kgs
- **PESO RECOMENDADO + 40 KGS**
- **SANIDAD**
- **ALIMENTACION**



- 
- 
- 

# PRECAUCIONES

- Encarnerada aparte
- Sin pérdida de peso durante la gestación
- Parición aparte



- 
- 
- 

# DESTETE



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 

## Destete

- Recuperación fisiológica y de estado de la majada
- **Mínimo 2 meses previo a la encarnerada**
- Tratamiento nutricional y sanitario de acuerdo a necesidades



•  
•  
•

# MANEJO DE LAS OVEJAS SECAS

- **REFUGO**

Boca, problemas podales, defectos de ubre.

- **SANIDAD**

Control de parásitos y podales

- **RECUPERACION**

Objetivo llegar con CC 3 a 3.5 a la  
encarnerada (consumo de estancia)

Posibilidad de loteo





# REFUGO POR PATAS





**REFUGO POR UBRE**



•  
•  
•

# **RETENCION de OVEJAS UN AÑO MÁS**

- **AUMENTO 10 a 15% LA ENCARNERADA**
- **MAYOR FERTILIDAD**
- **MAYOR CAPACIDAD MELLICERA**
- **MAYOR HABILIDAD MATERNA**
- **MAYORES NECESIDADES ALIMENTICIAS (CALIDAD)**



- 
- 
- 

# RETENCION de OVEJAS

- **SANAS**
- **DESGASTE DENTARIO**
- **CONDICION CORPORAL**
- **ALIMENTACION**
- **RECURSOS ALIMENTICIOS**

Pasturas

Suplementación



**Boca llena (separación  
incipiente, desgaste)**

**En campo natural da un cordero más.**



USADA



**Con acceso a mejoramientos  
da un cordero mas**



Invernada





# Invernada, horqueta y separación

**Sólo Invernada o descarte, ver firmeza (dientes flojos)**



- 
- 
- 

**UNA OVEJA ENCARNERADA  
PRODUCE U\$S 60 Y MANTIENE  
SU VALOR**



- 
- 
- 

## En el Corto Plazo

- **Objetivos y Decisiones**
- **MANEJO**
- **Nutrición**
- **Sanidad**



- 
- 
- 

# SANIDAD

- **Control de enfermedades podales**
- **Control de endoparásitos**





•Solo vacunos

•Solo ovinos



•PASTOREO MIXTO

# SANIDAD A LA ENCARNERADA

- Control efectivo de Parásitos Internos (al menos 15 días antes)
- Vacunar contra clostridiosis





- 
- 
- 

## MEDIDAS de CONTROL USADAS.



Pasturas seguras

## DOSIFICACIONES.



- 
- 
- 

# AL DOSIFICAR.

**CONTROLAR EL INSTRUMENTAL**

**PESAR LOS ANIMALES**

**REGULAR LA DOSIS**

**LEER LAS INDICACIONES**


**MONITOREAR a los 10 DIAS**

# FLUSHING

- Mejora de la alimentación 15 días previo a la encarnerada
- Duración: 15 - 30 días
- Objetivo: Aumento de mellizos
- Potencial Corriedale: hasta 50%



- 
- 
- 



**CADA CORDERO MAS SON  
U\$S 50 AL DESTETE O U\$S 90  
COMO PESADO**



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

# VAMOS A DEJAR QUE LA OVEJA TIRE SOLA DEL CARRO?



•  
•  
•  
**¿HASTA DÓNDE PUEDEN  
PRODUCIR NUESTRAS  
OVEJAS?**

**¿NO SERÁ UNA  
DECISIÓN NUESTRA?**




- 
- 
- 

# LA OVEJA NO SÓLO RENTA



- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 



# LA OVEJA TAMBIEN CIFRA



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

